
gelilact

Dénomination et groupe

GELILACT

Médicament utilisé contre les troubles digestifs des enfants.

Indiqué dans

Traitement des symptômes suivants:

- Vomissements habituels du nourrisson.
- Régurgitations provoquées notamment par aérophagie.

N.B. GELILACT n'agit pas sur les vomissements provoqués par une lésion organique du tube digestif ou par un agent infectieux.

- Troubles de la digestion du lait de vache (naturel, condensé ou en poudre).

GELILACT est indiqué chez les enfants recevant un régime de lait en poudre OU de lait de vache et qui témoignent d'une digestion défectueuse avec des selles grumeleuses, des rougeurs aux fesses et des vomissements occasionnels.

Comment l'utiliser et en quelle quantité?

Posologie:

Vomissements:

2 à 4 mesures pour 100 g de lait ou de bouillon de légumes.

Mauvaise digestion du lait:

1 mesure pour 100 g de lait.

Mode d'emploi:

Lait maternel et condensé: verser le lait tiède dans un plat et saupoudrer GELILACT en mélangeant à l'aide d'un fouet jusqu'à disparition des grumeaux.

Lait en poudre: mélanger soigneusement GELILACT à la poudre de lait. Préparer ensuite les biberons suivant les indications particulières à chaque marque de lait.

N.B.: 1. Agiter fortement le biberon au moment du mélange pour éviter la formation de grumeaux.

2. Il est possible de préparer tous les biberons de la journée en une fois. Pour les biberons inférieurs à 100 g, cette manière de faire est préférable pour éviter au maximum les erreurs de dosage.

Cas où l'usage du médicament doit être évité

- Obstruction intestinale.
- Inflammation ulcéreuse du côlon.
- Inflammation de la partie terminale de l'intestin grêle.

Effets non désirés

Aucun effet indésirable n'a été rapporté.

GELILACT ne provoque pas de diarrhées et n'est pas digéré.

Précautions particulières

GELILACT modifie légèrement le transit gastro-intestinal. Il peut donc modifier le taux de résorption d'autres médicaments. Il diminue le taux de glucose dans le sang après les repas; il est donc conseillé de l'utiliser avec prudence chez les enfants diabétiques.

Incompatibilités

Ne pas mélanger GELILACT avec des liquides acides tels que les jus de fruits.

Formes, voie d'administration, conditionnement et mode de délivrance

Poudre à usage oral.

Flacon de 60 g avec cuillère doseuse à 0.5 g.

Délivrance libre.

Conservation

Au sec, a température ordinaire (15-20C).

Gelilact se conserve jusqu'a la date mentionnée sur l'emballage après le sigle (EX). Les deux premiers chiffres indiquent le mois, et les deux oh quatre derniers l'année. La date de péremption est le premier jour du mois mentionné.

Composition

Carboxymethylcellulose sodique 58,8 g - dextrine - maltose q.s. ad 60 g

Titulaire de l'enregistrement

LAGEPHA sprl

Vieux Chemin du Poète 25

1301 Wavre

Fabricant

QUALIPHAR S.A.

Rijksweg, 9

2880 BORNEM